





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3923/A









Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3923/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3923/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3923/A



6569

A N D R E A E V V E,  
SALII BRUXELLENSIS,  
SCHOLAE MEDICORVM

Patauine professoris publici,

EPISTOLA, DOCENS

venam axillarem dextri cubiti in do-


lore laterali secandam: & melancholi-

cum succum ex venæ portæ ra-

mis ad sedem pertine-

tibus, purgari.

I N L A B O R E



APVD COMINVM DE TRIDINO  
MONTISFERRATI, ANNO  
M. D. XXXXIIII.



EPISTOLA AD CANDIDVM  
LECTOREM.

Explorata salus miseris mortalibus adsum,  
Rapta licet plagio, vel fugitiua ferar,  
Scilicet inuidiæ primùm deterruit atrox  
Tempestas, quid enim non premere illa solet?  
At domino tandem nolente repagula rupi,  
Nolente inuidia, publica facta legar.  
Tu modo frugiferū Philomuse capeſſe laborē,  
Conatusq; hilari suscipe fronte pios.  
Crescentes vegeta, at penitus ne despice vires,  
Post tenues orsus quæ meliora dabunt.



# CORNATISSIMO

CLARISSIMO'QUE VIRO NI-

colao Florenati, Inuictissimi Caroli

Cesaris Medico peritissimo, Domino

suo plurimum colendo, Andreas

Vvesalius Bruxellensis. S.D.



VOBVS nominibus, Patrone in primis obseruande, superiores tuæ literæ, plurimū me recrearunt: tum quòd tabulas in studioforū vsum à me editas, Cæsareæ Maieſtati ceterisque præſtantiffimis viris, vnice pbari ſignificas: tum quia pgratum tibi fore polliceris, ſi lineas ad marginē venæ cauæ de vena in laterali dolore ſecāda, & ad finē lateris venę portę, de melancholici ſucci p hæmorrhoides purgatione aſcriptas, diffuſius explicare contendā. A ple- riſque enim qd in illis ſentiam, parū perpendi arbitraris, remque cenſes dignam quæ fuſiori oratione explicata rationumque præſidio firmata, ſtudioſis legenda exhibeatur. Neſcio ſanè, utrū ex animi ſentētia magis, an iucūdius in vita obtingere quicquā poterat, quā illud à me expeti, quo erga te gratior aliquādo videri poſſem: idque propterea, quòd tu vnus ex

A ii



omnib. semp extitisti, cui non solum quicunq;  
 in me vel eruditionis, vel cuiusvis alterius ac-  
 cessionis argumenta extant, accepta ferre de-  
 beam, verumetiā quod ea est tuorum erga me  
 meritorum magnitudo, ut si quis accepti ex-  
 pensiq; inter nos rationē prestius cuncta an-  
 maduertēs inire velit, meum ē diārio tuo no-  
 men haud facile expunctū iri aliquando exi-  
 stimet, ac parētis potius quā amici loco du-  
 cendum te mihi censere queat. At rursus ex-  
 crucior, id mihi à te oneris potissimū iniungi,  
 cui neūquam par esse possim: aut si fortē p-  
 ingenij vires possim, nunc ea certē impendēt  
 tempora, ut hoc quicquid est, tacitus apud me  
 p̄mere, quā publicē (quod hodie plurimis  
 vsu venit) aliorū conuicijs me nouis parado-  
 xis exponere p̄optarim. Nosti nāq; quā  
 apertis verborū dissidijs, inflāmato studio,  
 & cōtentionum machinis eruditissimi quicq;  
 de vena in laterali dolore incidēda inter se di-  
 gladiant. adeo ut pauci alicuius nominis me-  
 dici reperiantur, qui hac de re quaecunq; sui  
 ingenij specimen edere nō sint aggressi, atro-  
 cissimas in se aduersariorū criminationes gra-  
 uissimasq; inuidiē tempestates concitātes. Ut  
 interim p̄teream rabulas istos noua omnia  
 respuentes, qui quum semel imbibitam here-



sim tueri student, maximis iniurijs contume-  
lijsq; illos laceſſunt, qui e directò lateris affe-  
cti venā secandā arbitrantur. Nondum opi-  
nor animo tuo excidiſſe, quod iam pridē de  
Louanienſib. medicis ſcripſi, inter quos quē-  
dam ſuo iudicio probè doctum, & nescio ob  
quas diuitias mire ſibi placentē, Manardum,  
Fuschium, Curtium & Briſottū medicorum  
Lutheranos in frequētiffimo eruditiffimorū  
virorum conſeſſu appellare nō puduit: quod  
illorū autoritate in publicis diſputationibus  
fretus, cōtra ipſius de vena ſecāda placitum,  
acrius fortē inſtarē. Exiſtimabat quidem vir  
pius, priſtinam Hippocratis medendi ratio-  
nē, à vetere inſcitia barbarieq; ſummis cona-  
tibus, ac ſubinde non mediocri familiaris rei  
diſpendio, vindicantes, tāquā medicinæ Lu-  
theranos, alijs atq; alijs iniurię plenjs nomini-  
bus irridendos: quippe qui cū ſapere ſibi ſo-  
li videretur, inſolito animi faſtu turgidus, reli-  
quos prę ſe aſpernari, quumq; aliud verē non  
poſſet, heresi nescio quam alijs obijcere ſo-  
let. deinde ne nos quoq; Candidati, eiufmodi  
peſtifera tabe inficeremur, conſuetis ſuis, hoc  
eſt, barbaris, ac ex vulgi fæce cōquiſitis vocibus  
vtēdum eſſe, impudentiſſimē occlamare  
conſuevit. Sed quid is, atque non diſſimiles

A iii



grylli obgruniāt, flocci ( vt subinde hortatus es) pendo. Quid vero elegātissimus doctissimorum Parisiensium medicorum coetus, preceptorū meorū, qd Manardi ac Brisotti manes, quid Fuschius, Curtius, Hubertus Barlandus, viri nostra ætate celeberrimi obijcerent, grauitè mihi perpendendum duco. qui tantis sudoribus & indefessis studijs, veram Hippocratis & Galeni de vena in pleuritide secāda sententiā tueri, & à profundissimis tenebris in lucē reuocare iam diu student: preter alios Europe peritissimos viros, vno ore in illorū sententiā descendentes. Malè profectò mihi consultū optarem, si illorum criminationibus me darem, quos tanquā numina & deos quosdā colendos esse semper iudicaui. Nam si Icarimore, pennis parum fixis, velut in artis operibus rebusq; tractādīs modicè versatus, nouū de vena in laterali morbo incidenda, dogma inueherē, hinc quidam sy-cophantiarum aculeos intētarent, illinc alijs, nulla rei habita ratione ilico maledicēdi studio nati, virulēto lingue spiculo me confoderent. Quæ licet contemnēda videantur, animūq; ingenuū à præclaro instituto reuocare neutiquam debeant, incōmodaturum tamē illis me scio, qui magnis lucubrationibus



congesta hac de re volumina, adhuc in manibus seruant, nonumq; (vt Flaccus hortatur) premunt in annum. His enim aut in me cōfutando nouum facerem negocium: aut si fortē in meā descenderent sententiā, iam opē rā oleumq; lussissent. Memini iam pridē Barlādi iustū volumen in Louaniens. modicos. me legisse, quod Ioanni Guinterio viro eruditissimo literatissimoq; cōmunicatū ab ipso autore erat. Verum id ob denegatā typographorū operam (quemadmodum in posteriori aduersus Fuschiū raræ eruditionis virum apologia, Brachelius falso iocatur) hætenus minimē latuisse mihi persuadeo, præsertim quū autographū ipsum exemplar Parisinos typographos obnixē summōq; studio expetuisse cognorim. Proximus huic est Curtius, acerrimi iudiciū vir, quē diu promissum commentarium de secanda in internis inflātionibus vena, editurum non ignoramus. Ostēdit enim mihi ante menses aliquot, cum partim ipsius causa, partim animi recreandi gratia Bononiam concessissem, ipsumq; prolixē ac familiariter conuenissem, tres eius commentarij impressos codices. Cur verò hætenus reliqui non fuerint subsecuti, vehemēter demiror. Hęc mihi crede, quominus, quod tā

A iiii



ANDREAE VVESALII AD

toperè suades aggredior, nō immerito me  
grauiter absterret, atq; intra septa cōtinent.  
Cæterū ne vel omnino tā honeste afflagita-  
tioni deesse diutius, vel tua in me beneficia  
parum agnoscere videar, nactus nūc à publi-  
cis prælectionibus nō nihil ocij quāmi libētis-  
simè ad te priuatim, quid hac de re sentiā, di-  
fufius quidē (sed cursim & tumultuariè) per-  
scribā: donec per ætatem aliquādo, rerumq;  
vsum, publico certamini me cōmittere susti-  
nebo. quāuis alioqui res sit ferè eiusmodi, vt  
quæ nec prolixa tractatione, neque varijs de  
mōstrationibus indigeat: sed quæ ex aliorum  
pricipijs, diligētissimāq; anatomes inspectio-  
ne præcipuè dependeat. Ne igitur longius te  
morer, duplicem tibi perspectā scio de secan-  
da in dolore laterali vena opinionē. Prioris  
quidē autores, è directo lateris affecti, venā  
interiorē cubiti secandam autumant, siue re-  
uulsionem, siue deriuationē moliri oporteat.  
Quamuis & hi nonnihil inter se dissideant:  
Alij enim in vna vena et reuulsionē simul et  
deriuationē faciendam esse contendunt, ali-  
ter facturi, si egrotātis vires duas illas euacua-  
tiones simul nō admitterēt: tunc enim popli-  
tis, aut malleoli è directo affecti lateris venā,  
ad reuulsionē diuiderent. deinde ad deriua-



tionē accedentes postridie, aut maiori mino-  
 riūre interuallo pro ægrotantis robore inter-  
 posito, eam celebrarent, venā cubiti è directo  
 patientis lateris intrepidè diuidentes. Alij ve-  
 rò huius sententiæ principes, siquidem ob vi-  
 rium imbecillitatē, reuulsionē duntaxat æ-  
 grum ferre arbitrentur, etiam venā affectū la-  
 teris solū reuulsuri secabunt, ac deinceps post  
 tēporis interuallum ex eadem vena deriu-  
 tionē molientur. De illo interim virium ro-  
 bore intelligas velim, quod aliquā sanguinis  
 ex vena educationem suffert. Alterius autē se-  
 ctæ principes, ab his planè dissentiūt, ac vnā  
 cum Arabū sententia Hippocratis & Gale-  
 ni placitum sese tueri arbitrati, corporis pleni-  
 tudinē & generationis morborum tempora  
 distinguūt, quod si plenitudine laborare, aut  
 sanguinem in partem ægrā adhuc fluere, cer-  
 tis indicijs suspicentur, reuulsuri, ad longissi-  
 mē distātia auocandum sanguinem suadent  
 atq; ex opposito lateris affecti, venā axillarē,  
 in cubito, aut venulā inter minimū ac sequen-  
 tem digitos procurrentē secāt. Quanquam  
 & inter hos peritiores inuenias, qui tunc pri-  
 mū ex poplite, aut malleolo interiori affecti  
 lateris sanguinem educāt. Celebrata itaq; ad  
 hunc modum ab ipsis reuulsionē, intermissis



sepe diebus pluribus, ad deriuationē prope-  
rant, qua sanguinē parti affectæ inhærentē,  
ac (vt ipsi loquuntur) in partem fluxū, se eua-  
cuaturos existimant, diuiduntq; venā cubiti  
ē directo lateris affecti. Si verò hi inter mali  
initia, corpus sanguine minimè turgidū, nul-  
lūq; humorem adhuc fluere (quod vix possi-  
bile arbitror) collegerint, etiam & tunc, pri-  
mū venam interiorem cubiti, ē directo affli-  
cti lateris, incident: licet eorum pleriq; nō leui  
errore extremæ manus venas frequentius, q̃  
cubiti, aperiendas prescribant. Porro quibus  
rationibus, singuli suum dogma, varijs atque  
hinc inde distortis autorum suffragijs sufful-  
ciant ac tueantur, tibi perscribere ridiculū pla-  
nè foret, atq; vt in prouerbio est *καλὺν κῶς εἰς ἀν-  
δρᾶς*, qui in hac palæstra, quemadmodū in vni-  
uersa Græcorum & Arabū medicīna, ad mi-  
raculum vsq; promoueris. Veniam tamē po-  
stulo, si vt meam sententiā persequar, certissi-  
misq; rationibus eam confirmē, nonnulla ab  
vtriusq; precipue agitata in mediū adduxero.  
Ante omnia itaq; in dolore laterali mittendū  
esse sanguinem, vtriusq; sectæ primores fatē-  
tur: nec parū interesse, hāc ne an illam in mor-  
bis venam incideris, excellentissimorum medi-  
corum suffragijs affirmāt. Dein triplicē san-



guinis euacuationem ex Galeno quoque statuunt, duas quidē sub auersionis nomine comprehensas. Priorem ad longinqua & contraria fieri aiunt, quam reuulsionē Latini, Græci vero ἀντίστροφον appellant: hac sanguinē aliquō fluentem fluxurumue, in cōtrarium retrahūt euacuantq;. Alteram auersionis speciem, derivationē & πρὸς ἕτερον vocant, qua sanguis ex phlegmone obsessa particula, per partē propinquiorem sanam educitur. Tertiā euacuationem, ex ipsamet parte implicita assignant, quæ minimē ad cōtraria perficitur. Fit vero hæc, dū scalpello inflammationū quasdam differentias etiā inter initia incidimus, quæ gangrenæ, phagedenæ, aut carbunculi naturam referunt. Ex illis namq; sanguinē sacrificata patiente particula sepe extrahimus, addentes quædam aliquando præter partis sectionē hircines, cucurbitulas, aut earū vice cornua cum igne, ne sanguis scilicet in parte coaceruatus, membrique naturam debilitans atq; euincēs, grauissima symptomata inducat: aut si quando maiore ad partē affectā in pestiferis bubonibus fluxū desideramus. Porro duntaxat de duobus prioribus euacuationis speciebus in proposita disceptatione medici pertractant, quum nemo inter morbi initia, affectū latus,



vt in suppuratis diuiferit. Intelligo autē hoc loco per euacuationem, sensibilem sanguinis educationem: non, quæ leuibus cucurbitulis, asperiori frictione, dolorificis vinculis, partis in aquam calidam merfioe, aut calidis emplastris, aut vnctionibus fit, reuulsionem, vel deriuationem. Reuulsionem præterea ad lōginqua peragendam, vtracq; proficitur turba: verum secundi agminis primipili simpliciter ad maximē lōginqua & distantia, ex Galeno in lib. xiiij. Curatiue methodi, & Hippocratis loco in libro de Humana natura, & Galeni in Arte medicinali, longinquum in reuulsionis definitione intelligendum esse, aduersarijs persuadere student. Quod tamen hi ipsi haudquaquam admittunt, cum Galenus in xiiij. Methodi eodem loco in incipiente iecoris inflammatione, dextrī cubiti interiorem venam, non quādem poplitis aut malleoli, aut etiam sinistri cubiti secandam venam subiunxerit. Insuper Hippocratis eam libri partem esse, cum Galeno inficiantur, & in Arte medicinali Galenū de præseruatione, non autem morbo, aut curatiua artis parte locutum affirmant. Vnde eorum quidam contendunt, tantam ad reuulsionem sufficere contrarietatem, quantam satis esse indicauit Hippocrates in vulgari illo li-



bri quinti aphorismo. Dolenti partem capitis  
posteriorem, in frōte recta incisa vena, pdest. „  
Vbi Hippocratem de reuulsione locutū Ga- „  
leni testimonio asserūt, suosq; aduersarios tā „  
quam stolidos demirant, qui ad commodum  
reuulsionis locum, tantam distantiam requiri  
ex Auicenna contendunt, quanta humeri ab  
humero est. Vnde inferūt, sectionem venæ in  
pleuritide cubiti phlegmonem patientis late-  
ris, à reuulsionis ratione nequaquam cadere.  
Quanquā & hi prioris opinionis principes,  
occasione postulāte, in præseruatiua artis par-  
te, externisue inflammationibus, ad maximè  
distantia (ex vena tamē insigniori) sanguinē  
particulę ægre influentem fluxurumq; etiam  
retraherent. De secunda verò euacuatiōis dif-  
ferentia, parum inter se discrepant. nam vtriq;  
ex parte membro laboranti ppinqua et sana,  
auertendum sanguinem in deriuatione opi-  
nantur. Propter priorem verò de reuulsione  
controuerfiam, alia inter illos agitur propo-  
sitio: videlicet, Num reuulsio & deriuatio ea-  
dem secta vena, interdum simul celebrari pos-  
sint. Primi, vt antea quoq; admonui, tanquā  
omnium suffragiis abunde comprobatum, id  
fieri posse affirmant, dummodò fluens fluxu-  
rusq; sanguis reuellendo educatur, ac in parte



leſa collectus,deriuando euacuetur: ac ob id  
in laterali morbo tanquã acuto & ſtatim pe-  
rimente,apta quidem ad hec habita vena,p̃-  
cipuè id faciendũ luculentiffimè p̃bant. Alij  
contrarium aſſerunt,rationes ſuas adducen-  
tes,ac ſi lateralis morbi futuri ſola ſuſpicio ha-  
benda foret,vel quẽdam cruris, aut manus le-  
uis inflammatio acutus ille morbus exiſteret.  
Videmus namq; quosdam ex ſecundę ſectę  
principibus,adeo ſuis rationibus irretitos, vt  
tres venę ſectiões in laterali morbo facere  
non vereant̃. primum pedis venam,q̃ è dire-  
cto eſt, ſecundò oppoſiti cubiti, ac demum cu-  
biti è directo patiētis lateris ſecātes. Quaquã  
in preſenti cõtentione præter alios complures  
Manardum aliàs diligentẽ, nec minus argu-  
tum,mirari ſatis nequeam,qui duas de ſecan-  
da in pleuritide epiſtolas,non quidem p̃fun-  
ctorie ſcriptas, ſatiſq; etiam grauiter ab ipſo  
autore probatas, poſteris reliquerit: deinde  
Fuchſium in extirpandis medicorum errori-  
bus ſedulum ſtudioſiſſimumq; qui iam quar-  
tò aut quinto de ſecāda in laterali morbo ue-  
na, ſuę ſingularis eruditionis ſpecimẽ propo-  
ſuit: atq; ea quæ nunc dicã,ex Manardo trãſ-  
ſumpſit. Nimirũ in venę interioris cubiti di-  
recta ſectiõe,nõ poſſe in internarũ partium



inflammationibus, reuulsionem ac deriuatio-  
nem vlllo modo simul incidere, ac nequaquā  
eam venę sectionem, deriuationē esse. Vidē-  
tur mihi profecto parum eorum, quæ ipsi do-  
ctissime ex Hippocrate & Galeno in mediū  
adduxerunt memores, atq; suarum de reuul-  
sione ac deriuatione finitionū obliti. Scribūt  
namq; ex secūdo curatiue methodi ad Glau-  
conem, in fluētibus quidem adhuc humori-  
bus, reuulsionem, ijs autem fluxionibus quæ  
iam partem obsederunt, deriuationem mede-  
lā esse. Ad hec, reuulsionem humoris ad lon-  
ginqua et cōtraria esse euacuationem. deriua-  
tionem verò, ex p̄xima loci affecti particula  
sanguinis educationem. Insup acriter & veris-  
simè cum aduersarijs cōtendunt, venę sectio-  
nem, quę in cubito e directo affecti lateris tē-  
tatur, ad reuulsionē in pleuritide abiūdē suffi-  
cere, atq; cum humore adfluēte inflammatio-  
ni quoq; inhærētem in eadem venę sectione  
(modò copiosior sanguis p̄fluxerit) uacua-  
ri. Quid q̄so aliud id indicat, quàm ea venę  
sectiōe reuulsionem deriuationemq; fieri: flu-  
entis nimirum adhuc sanguinis reuulsionē,  
& in parte laborante contēti deriuationem.  
Deinde parum animaduertērūt, dum aduer-  
sarijs persuadere conātur eiusdem lateris ve-



ne sectionem ad reuulsionē euacuationemq;  
sufficere, se deriuationis loco, euacuationis no-  
mine semper iuxta cum Galeno vsos: siquidē  
nihil aliud deriuatio censetur, quam humoris  
particulam obsidētis ad proxima euacuatio,  
quam euacuationis nomine in predicta ora-  
tione proculdubio Galenus significauit, quū  
reuulsio quoq; euacuatiōis species habeatur.

Sed fortē obijcient, illam humoris in parte  
contētī, post adhuc fluentis euacuationem, nō  
dicendam esse deriuationem, q; ex proxima  
parte sana non celebretur: quoniā ipsi fortas-  
sis absq; vlla limitatione partem propinquā,  
laboranti partī vicinissimā interpretabūtur,  
tamen si aduersarijs alioqui distantem partem  
in reuulsionis definitione maxime remotam  
intelligere vetant. Sanē hac ratione aduersa-  
rijs non modo minus æqui propinquū ad eū  
modum commētantes videbūtur, sed etiam  
sui ex Galeno dogmatis obliti conuincuntur,  
quod profitetur, reuulsionem deriuationēque  
per communes maioresq; oportere venas fie-  
ri. Deriuationem siquidem venæ eiusdem la-  
teris sectione celebrari posse inficiant, differē-  
tes nō aliter ac si solis cucurbitulis, aut calidio-  
ribus emplastris affecto lateri exterius adhibi-  
tis, deriuatio in pleuritide moliēda foret. Cu-  
cubitularum



curbicularum enim vsu, ac calidioris emplastris impositionem pro deriuationis exemplo, in pleuritide adferunt. Quamquam nec ego solis cucurbitulis in iunioribus imbecillioribus, ue corporibus interdum posse deriuari atque adeo reuelli, in pleuritide negauerim: Sed quum meridiana luce clarius sit, in omnibus propemodum totius trunci corporis internis inflammationibus, deriuationem venæ sectione celebrandam esse, quam venam quæso incidendam in his præscribent, nisi læso membro proximam in parte sana venam? At nulla interiori vena cubiti nunc dictis inflammationibus vicinior existit: quamobrem illam deriuationis gratia incidendam esse, probatum abundè relinquitur. nisi forte externam iugularem, sectioni ob difficilem impacti vulneris conglutinationem ineptissimam, aut in pectore venam exiguam nimis, nec ocys euacuantem, aperiendam contra omnium probatissimorum medicorum sententiam astruere contendant. Rursus quis auersabitur, id quod manifestissimis rationibus ad reuulsionem longinquum satis esse sibi demonstrare videntur, satis quoque ad deriuationem, parti affectæ vicinum esse: quum nihil ad opportunam venæ sectionē, in inter-

B



narū partium inflammationib. reperiri propinquius liceat. Sed quorsum attinebat, quicquā de vicinitate ad eius rei corroborationē adduxisset quum poplitis ac malleolorum sectionem, in coxendicis, renum, vteri, & vesicę affectibus cum Galeno ad derivationem sufficere verē profiteantur, illicq; euacuationi derivationis nomē non semel accommodent: nō perpendentes, malleolū ab vtero longius distitum, quā à superiorum costarum intervallo, in cubito axillare. Porro ne eruditissimos veteris medicinę vindices apud te suggillare videar, hac relictā disceptatione, ipse cōcedā, eodem tempore in eadē venę sectione reuulsionem & derivationem simul non fieri. Verum quādiū fluens, aut fluxurus adhuc ad læsum membrū sanguis ē vena educitur (quod inter initia potissimum fieri consuevit) reuulsionem celebrari: dum verō in partē dimissus atq; inherens ex eadem vena incisa profluit, derivationē perfici arbitror. Atq; in tota hac orationis meę serię ad eum modum reuulsionis derivationisq; nomen vsurpaturus sum. Accedit his inter aduersarios disceptationibus, Hippocratis dictio *κατὰ τὴν* à Galeno in secūdo ad Glauconem & alias sæpissime recitata, quinetiam alia eiusdem cū priore signifi-



cationis <sup>κωτ εὐθι</sup>. Harum vocum rationem ha-  
 ctenus parū animaduersam opinor, ac quē ad  
 modum vtriusq; factionis autores eas intelli-  
 gant, indicare esset quam difficillimum, quū  
 nemo vel per transennam, earum reddere ra-  
 tionē aggressus fuerit. Proinde omissis in p-  
 sentia nonnihil illorum contētionibus ac dis-  
 sidijs, quid semp ipse intellexerim, obiter ad-  
 scribam. Primum hanc vocem <sup>κωτ ιβι</sup>, quem-  
 admodum <sup>κωτ εὐθι</sup>, quas è directo interpre-  
 tantur, secūdum rectitudinem significare in-  
 dubitatum est. Vnde autem desumptę sunt,  
 non adeo constat. Ego ex fibrarum consensu  
 rectitudineq; eas primum deductas reor. Sci-  
 uit enim diuinus ille Hippocrates, venę atq;  
 arterię naturā ventriculi naturę ac intestino-  
 rum, vteri, cordis & vesicarum respondere: ni-  
 mirum ex fibris certis, nō autem vt fors fert,  
 contextā, quibus suas naturales actiones mo-  
 tusq; hęc vasa obire oportebat. Quibus. n.  
 organis attrahendī munus præcipuē concre-  
 ditum videmus, illis rectę & longę fibre in-  
 sunt quamplurimę, veluti œsophago, ad cibi  
 in vētriculum ex ore attractionem potissimū  
 a summo rerum opifice creato. At quibus in-  
 strumentis excernēdi propellēdiq; facultas præ  
 ceteris familiaris est, ea multis fibris transuer-

B ii



sis intertexta sunt, e quorū numero censentur  
intestina, excretioni potissimū seruiētia, ob  
idq; plurib. fibris trāsuerſis compacta. Atqui  
& vterū, quoniam diutius ad generis repara-  
tionem conceptum semen genitale retinere, q̄  
vel id attrahere, aut foetū in partu propellere  
oportebat, obliquis abūdare fibris, ex corpo-  
rum anatome in comperto habemus. Quin-  
etiam & cordi & ventriculo & vesicis amba-  
bus, quoniā æquali ferē attractione, expulsio-  
ne & retētionē indigebant, triplex fibrarū ge-  
nus, natura frustra nihil creans, illis æqualiter  
propemodum commisit. Enimuero Galeno,  
Herophilo, Marino, cæterisq; dissectionū p-  
fessoribus firmissimum theorema est, in natu-  
ralibus corporis motibus, rectis fibris (aut vt  
aliī vocant, villis) attractionem, trāsuerſis ex-  
cretionem, obliquis retētionem perfici. At re-  
tentionem, attractionem & excretionē in prę-  
sentia appello, quibus iam dicta instrumenta  
vniuerso corpori inseruiūt, non quibus pro-  
prium alimentum attrahunt, conficiūt, ac do-  
nec confectum sit retinēt. Porro triplex illud  
fibrarum genus, ac tres naturales functiones,  
quas a iocinore venę sortiuntur, minimē ne-  
gligendas Hippocrates duxit, quū diceret se-  
cūdum rectitudinem secandam esse venam,



siue deriuationem, siue reuulsionē moliaris:  
per rectitudinem inquam, fibrarū rectitudi-  
nem obseruandā, atq; consensum peritissimē  
insinuās. perinde ac si secta remotiori, & ob-  
seruata huiusmodi rectitudine, melior fieret  
humoris ad partem egram cōfluentis fluxuri  
ue reuulsio, & diuisa viciniori, præstantior a  
parte laborante deriuatio. Nemo enim sanæ  
mētis inficias ibit, in venę sectione naturales  
facultates, quib. venæ toti corpori in sangui-  
nis administratiōe famulant, torpere, ociosas-  
que esse: atq; venas ad sanguinis eductionē,  
versus impactū ipsis vulnus, & dolorificā li-  
gationē & frictionē, aut calētem aquā, suis re-  
ctis fibris & trāsuersis plurimū auxiliari: po-  
stremò illā fieri fluxus rationē quam ex dolo-  
re in inflammationibus Galenus assignat ne-  
minem latere debet. Hæc enim præter cetera  
quam plurima ipsius loca, in libro decimoter-  
tio Curatiuæ methodi de inflammationū ex  
causa externa generatione, ipsius sunt verba:  
At quę dolēt, cernuntur ea quoq; phlegmo-  
nem ex dolore pati, sed causam eius nō omni-  
nò assignāt quidā nullo modo probabilem.  
Nostra vero sententia est talis. Docuimus in  
eo opere qđ de Naturalibus facultatibus edi-  
dimus, vnam esse naturæ facultatē quam ex-

B iii



„ cretoriam dicimus. ea suo munere tum fungi  
 „ tur, quum triste aliquid sentit. vnum verò  
 „ quiddam est ex ijs, quæ eam contristat: ipsa  
 „ quæ dolorem excitat causa, quæcunq; ea sit.  
 „ Hanc igitur eñcere dum properat, phlegmo-  
 „ nem interdum in particula concitat: cum e-  
 „ nim primis suis conatibus nihil proficit, vehe-  
 „ mentius aggressa, quod infestat, sanguinis  
 „ aliquid & spiritus ex superpositis partibus,  
 „ in afflictam simul exprimit. Quinetiam nisi  
 dictam nunc functionē excretoriam per suas  
 fibras in sanguinis missione ipsum educere,  
 illumq; ad partis subsidium attrahi in cōfes-  
 so habeamus, rationem qua ex inferioribus  
 ad superiora, & à dextris ad sinistra in venæ  
 sectione sanguis cōfluit, imaginari perquam  
 arduum & omnino impossibile erit. Quis e-  
 nim vacui ratione omnia peragi ratiocinabi-  
 tur? quum penitus amoto vinculo, aut cali-  
 da aqua, aut cessantibus frictionibus sanguis  
 vix amplius exvena promanat. Ad hæc aliud  
 „ nihil indicarunt primi illi medici, venæ sectio-  
 „ nem per duos diametros fieri sanctissimè p-  
 „ hibentes, quàm eiusmodi sectione, fibrarum  
 „ rectitudinem atque consensum perdi. Iam ve-  
 „ rò si alia huius Hippocratici dogmatis ratio  
 „ inuestiganda foret, qua aliud à consensu fi-



brarum Hippocratem iudicasse probabiliter  
astruerem, nulla se offeret, quam non statim  
ad hanc de qua modo loquor rectitudinem  
referri oportebit. Nam si quis rectitudinem  
hanc intellexerit, rectam lineam, sicuti præ-  
sentis negotij ignaro imaginari esset quàm  
promptissimum, fortasse rectitudo à dextra  
capitis parte ad pedem dextrum esset: parua  
autē, aut penitus nulla ad dextram manum.  
Quod si is manus ad crucis effigiem extēde-  
rit, rectitudinem metietur à iugulo ad cubi-  
tum, imò & à dextra manu ad sinistram: sed  
iecoris cum dextro cubito, ac lienis cum sini-  
stre manus extremo, rectitudinem fingere,  
perquàm difficile erit. At verò si forte has re-  
ctitudinis quoque differentias esse quis conten-  
deret, quo pacto obsecro is rectitudinem in  
angulo totius corporis acutissimo, suisque co-  
stis longissimo statuet? cuiusmodi triangu-  
lus est, cuius primus angulus est supra ossis  
sacri latiue principium, secundus in dextro  
poplite, aut pedis dextri interiori malleo-  
lo, tertius vero in sinistro genu, aut pede.  
Hic namque triangulus necessario consurgit,  
si dextro pede laborante, in sinistro crure ue-  
nam secueris, aut aliquam interiorē cruris  
partem scarificaueris: ac proinde fingendo

B iiii



rectam lineam ab Hippocrate intelligendam esse, summā obliquitatem, peæter sensus communis indicium, rectitudinem esse fateamur oportet. Iisdē rationibus improbabitur præsentium dictionū ratio, nunc primum à quo piā (ut ipse ait) celeberrimo apud Bononienses medicinæ professore, excogitata per rectitudinem nimirū intelligendam esse, vnā corporis partem, ad eum modū quo Hippocrates *ἡ ἀριστερὴ* corpus esse tradidit: duos scilicet oculos, duas aures, renes duos, & ut rē in pauca cōtraham, ait ipse dextra sinistris respōdere, ob idq; dextra inter se, et sinistra inter se rectitudinē sortiri, nequaquā verò dextra cum sinistris consensum seu rectitudinem obtinere. Atq; ut ea sentētia plus roboris nanciscatur, adijciā dorsalē medullā à suo mox principio (quod ego ex cerebro, nō autem cerebello esse existimo) vnicam esse, & tantū lateris vnus esse cōsensum, vt media eius pars reliqua illeſa resolutione infestatur. Quā verò is scopū attigerit, ipse apud te excutito. nam præter hæc quæ proponit, sanguinem quoq; in vena secundum longitudinem septo quodam diuisum fingat necessum est. Nec quia corpus geminum est, statim sequitur, dextras venas dextris, et sinistras sinistris rectitudinē



mutuam participare: sed quod fibræ ad eum modum sint à natura conformatæ, quanquã, vt in sermonis progressu fortasse ostendam, falsum, sit, venam nutrientem nouem, aut decem ( aut si in præsentiarum voles, octo ) costas inferiores vtriusque lateris, cū sinistri cubiti, aut cruris sinistri venis rectitudinem vllam obseruare. Vt corpus quidē vtrinq; æquē ponderosum redderetur, geminū natura id esse voluit, ac venę parī carentis tanquā æquilibrium quoddam præbuit, arteriā magnā ad inferiora thoracis propter spinæ sinistrum latus delatam, venam verò dextræ spinæ regioni inniti voluit. Præterea is respuet Galeni sectionē ex dextro malleolo, aut poplite ad sinistrū, Hippocratis ex occipitio ad frontem, quę tamen secundum fibrarum rectitudinem celebrantur venarum sectiones. Insup multo magis incusabit incisionē, quę in dextrę manus phlegmone ad sinistrā, aut sinistræ ad dextrā celebratur, in qua tamen optima seruatur fibrarū rectitudo atque cōsensus, si in illis corporib. inciderit, in quibus axillares à caua ante magnā in gladio bifurcationem propagantur. Verum res ea dilucidior est, quàm quę plixiori refutatione indigeat, quā citius quis sibi persuaferit, si incon-



suta veste vniuersum corpus indutū imagi-  
nabitur, veluti in larualib. diebus ac theatris  
nudā, aut demonis psonā referre studentes, in  
dū cōsueuerūt. Nā si quis ex inferiore dextri  
brachij regione filum euellere conabit, cōspi-  
ciet id ex dextro thoracis latere, adeoq; ex si-  
nistri pedis plāta, recta sursum ad primū ex-  
tradictionis locū ptingere. Si verò ex supiori  
brachij parte filū euulserit, ex capitis dextra  
regione filū versus primū extractiōis locū p-  
trahetur, atq; eadē sinistri lateris ratio est. Itē  
si ex interna dextri cruris regiōe filū trahere  
molietur, ex interiori sinistri cruris parte, filū  
pducī sub peritonæo intuebit. Deinde si ex  
medio dextri brachij filū protraxerit, ex sini-  
stra manu id succedet. Quoduis autē filū ex  
dextra manu aut pede euellere studuerit, nul-  
lū ex sinistro thoracis latere, versus dextrum  
mouebit, multoq; minus ex dextro ad leuū.  
Verz quū ars naturā i venis ab eo exēplo di-  
scendentib. egrē imitari potest, hęc ex corporū  
anatomy vnūquēq; medicū obseruare cōue-  
niebat, nec absq; exacta venarū notitia de ip-  
sarū in morbis sectiōe AEsculapios nostros  
sola autoritatū cōgerie fretos, Andabatarum  
more, rixosē cum aduersarijs decertare. Noui  
equidē inter cōteros quendam q; secundo de



vena in dolore laterali secanda cōtra Galeni  
sententiā scribere haud veritus est, priusquā  
vel per somnū quidem Anatomen vidisset:  
quanq̃ haecenus vnica dūtaxat, me p̃functo  
rie administrāte, astiterit. Proinde saluo accu-  
rato tuo iudicio, erit mea cū Hippocrate sen-  
tētia, ad foeliciore oportunioremq̃ uenę se-  
ctionem, siue deriuatio siue reuulsio moliēda  
sit, perpetuò venā secūdū fibrarū consensum  
ac rectitudinē incidendā. Huic axiomati, ex-  
actam venæ in thorace distributionē subiun-  
gam, quam ad hunc modū vt plurimū habe-  
ri animaduerti. Venę cauæ trūcus ex iecoris  
gibbo superiora petens, ac septū transversum  
permeans, duos atq̃ interdū tres insigniores  
ramos septo cōmunicat. Deinde admodum  
exiguas, ac capillaribus venis simillimas so-  
boles in duas mēbranas thoracē intersepien-  
tes (σπασμένη Græci vocant) diffundit. Cor-  
di verò inuolucro si accuratē dictas mēbra-  
nas ab ipso abstuleris, nullā ferē aut perq̃ exi-  
lem à caua venulam, cōmunicatam reperies.  
Iā cordis basim & ipsius dextrā auriculā ca-  
ua attingens, ex media sua regione in dextrū  
cordis sinū aperitur, ipsiusq̃ venæ corporis  
portio, illi insinuatur. Hęc priusq̃ in sinū pla-  
nē desinit, venā coronę modo cordis basim



cingentem, ac in vniuersam ipsius substantiā  
 excurrentem producit: quā interdum gemi-  
 nam, sicut & duas coronales arterias, inter se-  
 candū obseruauimus. Fit verò hæc caua ue-  
 næ in dextrum cordis sinū diuarcatio, supra  
 quintam dorsi vertebram, cui basis cordis ab  
 anatomicis supstrata asseritur. Deductis his  
 propaginibus, caua vena cordis dextræ auri-  
 culæ firmissimè adnata, paululumq; ad lōgi-  
 tudinem sæpe vnius vertebræ ascendens, ex  
 dextra sui parte, in simiis, canibus alijsq; pxi-  
 mè hominem referentibus animalibus, venā  
 dispargit, quæ dextræ spinæ regioni innixa,  
 deorsum ad vltimam vsq; thoracis vertebrā  
 ac primā secundamq; lumborū contorque-  
 tur, ac vtrinq; singulis sibi correspondētibus  
 costarum interuallis, singulos ramos satis insi-  
 gnes communicat. Quū verò Galenus in se-  
 cūdo de Victus ratione in morbis acutis cō-  
 mētario Aphorismi decimi tradiderit (vt in-  
 terim mendacem locum in libro de Venarū  
 sectione silentio præteream) hanc venam e re-  
 gione dextræ auriculæ oriri: fortasse dubitaue-  
 rit aliq; in Anatomæ speculatione parū ver-  
 satus, num eadē in hominibus ac in alijs qua-  
 drupedibus animantibus, venæ caue hoc in  
 loco distributio inueniatur: an ne sub cordis



basī, autē regione eius quæ in dextrū cordis  
sinum vena properat, aut etiā priusquam ca-  
ua cor attingit, vena sine parī à caua ppaga-  
tur: siquidem & postremum illud, Galenum  
in dicto nunc commētario, his indicasse reor.  
Huic ego de venæ ortu percunctanti, præter  
oculatam fidem, nihil in rei testimoniū adfer-  
re possum. Quantūvis namq; operosè & in-  
dustiē venæ cauæ diuaricationi animū ad-  
hibuerim, perpetuo supra cordis auriculam,  
venam sine parī, non aliter atq; in canibus ac  
simiis, in hominibus propagatam deprehen-  
di. Supra autē ita à me dici intelligas velim,  
ad naturalem auriculæ situm, non autem ad  
summum eius apicem digitis ad superiora at-  
tensum. Nec meis tantum oculis fidem adhi-  
beri postulo, verū omnibus, qui Lutetię, Pa-  
tauī, Louanī, & alibi nō semel mihi publicē  
administrātī astiterunt, vbi vt verā de venæ  
sectione scientiam nāsceremur, eam Anato-  
mes partē diligentius sum aggressus. Taceo  
interim me, in vtriusq; sexus corporibus om-  
nes costas hac vena nutriti, Patauī in frequē-  
tissimo eruditissimorum spectatorū cōfessu  
ostendisse, quum nuper publice mihi demon-  
strandi secādicę prouincia demādata fuisset.  
Deinde nō præter rationem, hanc inter cæte



ras venam coniuge carentē, ac sine pari Latini, Grecis vero αὐγὴν passim appellat legimus. Siquidē ita nominari meretur, quod ex latere opposito nullam sibi correspondentē venam sortitur. quam indubiē haberet, si ē regione dextræ auriculę propagaretur: eam videlicet, quæ ad dextrum cordis sinum pertinet, cui coronalis uena coniunx creditur. Sub cordis autem basi, aut priusquā cor caua vena attingit, eam enasci, nemo vel qui ipse secādi munus obierit, vel qui secantem spectarit, asseret. Hęc quidem eō induxi, vt commonstrem hanc supra cordis auriculam venamq; in cor dispersam, super quartam & ferē tertię metaphreni vertebrę finē a caua etiam in hominibus productam. Est & aliud circa presentis venæ initium non oscitanter obseruandum, eam nimirū, vt prius quoq; admonui, à caue dextro latere enatam, nō autem (quod fortē q̄spiam Anatomes ignarus, atq; deprauato Galeni loco in libello de Venarū sectione illusit asseret) ex ipsius sinistro, aut medio quā spinam caua respicit enatā. Quod si q̄s inficiabitur, ob oculos fidelissimos rerum testes corā ei obijciam, quibus si orbatus q̄spiam huiusce rei aliud requirat testimoniū, is per me vel solo tactus sensu euadet certissi-



mus modò secāti mihi haud dedignetur asfi-  
stere, vel præstantissimorū virorum iudicijs  
assentiri non detrectet. Ceterum miraberis  
forsitan, cur adeò religiose de venè huius or-  
tu disceptē: Nō ob aliud sanè, quàm vt nouē  
& aliquādo decem inferiores vtriusq; lateris  
costas, ea nutriri mihi annuas, illamq; à venē  
cauē dextro deductam largiaris: præsertim  
quū norim, non ad manum ilicò corpus hu-  
manū fore, ex quo hæc ( si absurdiora duxe-  
ris) contēplari queas. Adde & meę proposi-  
tionis robur, hinc imprimis desumendū. Sed  
ad reliquas venæ cauæ soboles reuertamur.  
Vena caua postquā hanc sine pari distribuit  
venā, sursum ad glandiū properat, vbi mox  
bipartita in duos truncos finditur. Dexter  
(idē de sinistro intellige) venā producit pri-  
mę costę innixā, ac sub clauicula ad axillam  
procurrentē. Ad huius originem à caua ve-  
na ad tres supiores costas dextri lateris, vena  
diffunditur, adeò exigua, vt subinde visum  
effugiat, imò sepius ipsam deesse repies, quū  
paruis illis costis ab axillari ipsis incūbente  
abunde nutrimenti frequenter suppedietur:  
Truncus hic, post harum venarum distribu-  
tionē sursum conscendens, internā dextram  
iugularē, & ad trāsuersos vertebrarum colli



processus pertinētem venam à se deriuat. Reliquum autem eius in externam iugularē, cuius ilico humeraria soboles est, finitur. Verū in gladio, ubi paulo ante dicta fit bifurcatio, duę enascuntur venę, ad vtrunq; pectoris ossis latus, vtrinq; vnā procurrētes: à quibus pectori mammillisq; alimētum precipuē administratur. suntq; eę, quę cum vteri venis sub rectis in abdomine musculis coeūt. Nutriunt itaq; vniuersum thoracē, vena parīs expers, duę ad trium superiorum costarum interualla, & duę ad pectoris os delatę. At quemadmodum etiam in nostris dissectionū tabulis adnotauimus, hæc in gladio magna cauę bifurcatio, subinde post axillariū venarū propagationem, primum conspicitur. Iam quid Galenum mouerit, cur obscurius, & secum eodē loco pugnans, venę absque pari in hominibus, quàm ceterarum corporis venarum mentionem fecerit, ac quamobrem venas in propria de venarum tractatione prætermittas, ferē *παρεγγυος* alibi recensuerit (si modo de ipsius oraculis dubitare fas sit) subiungam. Legitur quidem in secundo Hippocratis libro de Vitis ratiōe in morbis acutis, Aphorismo decimo, ad hūc modum. Quum ergo ad iugulum dolor extenditur, aut grauitas vel brachium,



chium vel mammillam, aut partes quæ supra  
transuersum septum sunt, dolor affligit, inter-  
na cubiti vena secanda est. Dein paulo post  
Hippocrates subiecit. At si partes quæ sub trās-  
uerso septo sunt, dolor infestat, sed ad iugulū  
non ascendit, tū vel nigro veratro, uel peplio  
alius ducenda est. Præsentem Aphorismum  
Galenus commentatur, ac si Hippocrates præ-  
cepisset, phlegmone in laterali dolore costas  
superiores affligente, sanguinis missione utē-  
dū esse. Quando verò in costis inferioribus  
inflāmatio hominem cruciat, medicamento  
purgante esse subueniendū. Perquirens igitur  
Galenus causam, quapropter deicientis  
medicamenti potius, quàm sanguinis missio-  
nis usum prætulisset Hippocrates, venarum  
distantiam arguit, ac suam ferè sententiā ad  
tritum nostrorum medicorum placitū refle-  
xit, quo docetur, sanguinem prauum ex loco  
affec̃to per partem nobiliorẽ minimè trahen-  
dū: quasi uenæ interioris cubiti sectione, per  
cordis regionē ex inflammatione nothas in-  
ferioresq; costas occupante, sanguinem trans-  
uehi necessum foret. Cæterum Galenus hæc  
parū efficacia perpendens, quantumuis Hip-  
pocrati contradicere religiosissimè semper ca-  
uerit, tandem tamen tacitè subiecit, quod post

C



ea Aegineta apertius explicuit: nimirū venę  
 sectione potius quā purgante pharmaco  
 vtendū esse propter eam quam medicamen-  
 tum purgans adducere consueuit perturba-  
 tionem: quodq; semel exhibitum medicamen-  
 in manu, quemadmodū incisam venam, non  
 teneremus. Atque ita, qua potuit summa mo-  
 deratione Galenus se repressit, vt quā mini-  
 mū ab Hippocratis sanctione recedere uide-  
 retur. Quod vt fieret facilius, ad eum quem  
 dixi modum, de vena sine pari pertractauit,  
 scopum dirigens, quasi vena coniugis expers,  
 ab incidendis venis plus æquo distaret. Hanc  
 contra Hippocratem sententiā præstantissi-  
 mi quiq; mediocrū amplexantur, atque utri-  
 usque sectę autores in eam quoq; cū Galeno  
 descendunt. Quamuis non ignorē, quosdam  
 Hippocratis verbum *ἢ ὑπὲρ τοῦ* de humoris po-  
 tius ad superiora affluxu, quā de doloris ex-  
 tensione, perperam interpretari. Liceat igitur  
 (oro) me, affectu nonnihil seposito, Hippocra-  
 tis dictionem apud te summū veritatis ama-  
 torem, examinare: siquidē vniuersum ferē la-  
 tus à clauiculis ad ilium ossa usque, ab Hippo-  
 crate intellectum mihi persuadeo: vt in priori  
 quidem periodo, partem lateris duodecim co-  
 stis interseptam, posteriori vero, quod à septi



transuersi orbiculo infra ad ilium os vsq; perti-  
 net, Hippocrates idicasse videatur. Agit enim  
 de tenliui doloris extensione productioneq;  
 non autem de phlegmones atque doloris pū-  
 ctilis regione. Et in quacunque tunicae costas  
 succingentis sede inflammatio substituerit, cer-  
 tissimum est tensionem ad iugulum ac clauic-  
 ulas vsque ob consensum necessario percipi:  
 Nouimus quippe in iecoris inflammatio-  
 ne, ad iugulum vsq; tensionē molestare: non  
 alia profecto ratione, quam quod septo trans-  
 uerso iecoris grauitate deorsum protenso, su-  
 perior eius membrana à tunica costas succin-  
 gente enata, simul protendatur, atque ita per  
 consensum totius succingentis tunicae dextra  
 pars, tensionis sensu, ad iugulū vsque infeste-  
 tur. Impossibile enim est, membranam angu-  
 stiores ac duriorē, naturaq; maximè proten-  
 sam, aliqua sui parte vehementius ex inflāma-  
 tione prætendi, quin vniuersa tensionis parti-  
 ceps ilico efficiatur. Quod uero in secūde pe-  
 riodi initio dixerit, *ὕπὸ τῆς φρένης*, non autem  
*μετὰ τὰς φρένας*, an ne quod proposui confirmat:  
 eam enim orationem sub septo transuerso si-  
 gnificare, neminem latet. Verū qualiter infe-  
 riores costę subiectæ dici mereantur, vix satis  
 assequor. Nam septum transuersum à fine os-



sis pectoris, ubi in mucronatam cartilaginem  
 definit, principium sumens, ac paulatim spu-  
 riarum costarum finibus annexum, tandem ad  
 thoracis undecimam vertebra[m] iuxta duode-  
 cimam uertebrae principium pertingit, fortissi-  
 misque ligamentis illis & primis lumborum ver-  
 tebris annectitur. Quare si hominem ambula-  
 re, sedere, aut stare imaginemur, nulla prorsus  
 costa septo subiecta erit. Verum si quis homi-  
 nem supinum procumbere voluerit, idque sub  
 septo esse contederit, quicquid infra vertebra[m]  
 est regione superioris septi exortus locata[m] posi-  
 tum est, illi idem Sub, quod est regione, necessa-  
 rio denotabit. Quamquam nec ita praeter duas  
 tresue vertebrae cum suis costis sub septo ali-  
 ud foret. Septinamque superius initium, est regio  
 nonae vertebrae thoracis esse, coniectura as-  
 sequor. Quamobrem ad hunc modum Hip-  
 pocratis oraculum intelligens, necessario com-  
 muni sensui derogabit. Praeterea ex Galeni sen-  
 tentia sequeretur, Hippocratem duntaxat in  
 quatuor superiorum costarum inflammatio-  
 ne sanguinis missionem praecipisse, quum ex  
 ipsius sententia, octo utriusque lateris costae  
 venae sine pari ramis nutriantur. Caeterum si  
 Hippocratis Aphorismum ad meam senten-  
 tiam accommodauerimus, tunc demum vena-



rum distantia locū habitura est, ob quam forte venę sectioni, medicamentum purgans esset præferendum. Lumbis namque sub septo transuerso proprię locatis, a venis secandis nihil remotius in corpore dissitum imaginari licet: adde illis exiles venulas, non quidem magnas, quemadmodum ventriculo, lieni, renibus, vtero, vesicę, alijsq; visceribus esse a natura comunicatas. Deinde viciniissimi sunt lumbi ventriculo & intestinis, ob idq; faciliorem medicaminum futuram actionem, nemo inficiabitur. Postremò si venarum distantiam ex Galeni sententiā ad Hippocratis excusationē argueremus, iecore, liene, ventriculo, renibus & vtero phlegmone obsessis, non mittendum esse ex Hippocratis præscripto sanguinē colligeretur. Ad huius, sententię firmitus robur conciliandum, aliquot Hippocratis Aphorismos ex Aphorismorum libris adducere, nisi mihi cum singulari tua medicinę cognitione res esset. Nec me monet, quod contentiosior quispiam forte obtrudet, si lumborum seu illius dolorē sub pleuritide cōprehendero, me pleuritidis voce abuti. Cui respondebo, id morbi nomen ex eorū esse genere, quę a loco affecto primā impositionem sumpserunt, cuius generis est nephritis, peripneumonia, ophthal



mia, coxendix: significabitq; mihi id nomen pleuritis, vniuersi lateris affectum, non autem solius costas succingentis membranae. Veluti pleriq; opinantur, eam membranam barbarè pleuram vocantes. Præterea id nomē a costis, quæ etiā quod latus constituunt, πλοῦξι nuncupantur, nequaquam primam impositionem assumpsit: quum ueteres Latini scriptores pleuritidim dolorem lateralem, potius quàm costalem appellant. Hæc quidem eò refero, quòd Galenū de ea vena obscurè scripsisse, ad marginem mearum tabularum indicauerim. vt que Hippocratis sententiam fuisset ostenderem, in quacunque costas succingentis membranae parte, phlegmone infectauerit, venam potius secandam. quàm purgans medicamentū porrigendum. Sed ne uidear hæc anxie nimum apud te excutere, ad rem reuersus, principio pedem cum prioris selectæ autoribus (equibus & tu vnus semper exististi) conferam: qui ē directo affecti lateris venam inter initia in cubito secandam præscribunt. quorum præcipuas sententias & axiomata mihi tanquam optimè uerissimè que ab illis Galeni aliorum que præstantissimorum medicorum autoritatibus, atque adeò optimis rationibus probata assumam. Est igitur



tur vobis firmissimum theorema, ex eadem vena reuulsionem & deriuationem posse fieri: quod est, constantibus ægri viribus, vna sectione posse fluentem humorem ad longinqua reuelli, atque adeò euacuari, & iam in inflammatione contentum sanguinem per propinquum deriuari, ac simul educi. Quum hæc interdum licere ostendistis, adijcitis postea, id maximè in laterali dolore præstandum esse, quum is morbus tam acutus perimens que sit, vt duas illas euacuationes simul ilico expetat, neque vt illas intermissis vicibus celebres euacuationes, inducias præbeat. Addam & venam cubiti è directo lateris affecti, satis ad solam reuulsionem dissitam: si forte illam duntaxat, ob virium imbecillitatem, adhuc fluente sanguine, exequi cogeremur. Deinde ad deriuationem, nullam ea quæ laboranti lateri è directo est, viciniorè ad commodam sectionem reperiri existimatis. Postremo vtrunque auersionis speciem secundum fibrarum rectitudinem atque consensum faciendâ, superius abunde demonstrauius. Ex his inducetur, si quis corpore plethorico ac succorum abundantia laborante, viribus utcunque robustis in superiorum trium costarum partis dextræ aliqua phlegmone corripia-


C iiii



tur, illi sanguinē inter initia ex dextra axillari educendum, donec vel rubicundior multo, vel pro puro rubidoq; liuidus effuxerit: utrū, que enim accidere testatur Hippocrates. Si uero in sinistris costis superioribus inflāmatio constiterit, aperietur intrepidē parī ratione, sinistra axillaris. Atque hæc omnia tecum confiteor. Verum vt negocium dilucidius paulo ob oculos collocem, venas thoracis obiter delineabo, quo mathematicorum more rem aggre- diamur.



AD VENAE THORACEM NVTRIENTES. 4.





In hac vera, quamuis rudiori figura, A litéra significabit nobis venam axillarem dextrī brarhī, ad cubitum vsq; deductam, ibiq; abtruncatam: B sinistram axillarem, G magnā in glandio aut iugulo bifurcationem denotabit. D & E ambas venas ad anteriora thoracis sub pectoris ossē perreptantes. F uenulam nutrientem tres costas superiores latetis dextrī. G venam alētem tres elatiores costas sinistras. H venę caue truncum planē dissectum, vbi dextram cordis auriculā caua tangit, atq; in cordis sinum dextrum ingreditur. I venā sine pari ex caua natam. K, K, &c. nouem ramos venę absq; pari, nutriētes nouem costas dextras. L, L, &c. soboles eiusdem venę nouē humilioribus costis sinistris alimentum supeditantes indicant. M verō, dictæ nunc venę finem, qui per inferius septi foramen, per quod arteria delabitur, ad lumborum vertebra vsq; excurrit. Age igitur laborante F, secabo A: ea siquidem sectione sufficientē contrarietatem, & distantiam, & fibrarum rectitudinem, atq; demum vicinītatē seruaturus sum: ob idq; opportunē reuulsurus, ac simul deriuaturus, dummodo vnā fluentem, adhuc in partem læsam sanguinem, & iam partī affectæ inhærentem eduxero. aut si fluentem



duntaxat euacuauero, solum reuulsurus. Sic pari ratione, si G phlegmone affligatur, recurram ad B. eadem, quæ sectione venæ A, laborante F, præstiturus. Similis quoque de pectoris venis ratio est. nam D laborante, aperitur A. E vero inflammatione implicito, secatur B. Atque tecum actenus consentio: imò amplius, si laborauerit I, aperiam venam A. Sic si aliqua partium intercostalium denotatarum per K inflammatione corripì cœperit, incidendam dico A. Nam A, cum illis, seruat rectitudinem, & satis ad reuulsionem distat, nullaque vena gratia deriuationis vicinior opportunè sectioni offertur. Verum in quo abs te discrepem, ita habeto: si venarum aliqua significatarum per L, hoc est decem inferiorum costarum, intercostalium partium quæpiam phlegmone implicetur, nonne vestrorum achilleis rationibus confirmatorum axiomatum obliti, secabitis venam B, hoc est sinistram axillarem? arbitrati nimirum, fibrarum rectitudinem consensumque vos obseruaturos, atque viciniorē venam incisuros? Oportebit mehercule vos ad hæc animaduertentes, non B sed A secare. Nam sanguis impactus in L, nusquam nisi ad I deduci poterit, cum quo omnia L fibræ consentiunt, atque vicinissima existunt. Sed laborante I, aperit A: ergo & affli-



cū aliqua venarum L, referenda est vena, A  
 modò reuulsionē, aut deriuationē solam, aut  
 simul vtrunque moliri ex alterutro brachio  
 propositū fuerit : quū vtramque auersionis  
 speciē per fibrarū, vt ostendimus, consensum  
 atque rectitudinē celebrare oporteat, qualis  
 nulla est L cū B. Præterea vicinitas ab L ad  
 B, quæ in deriuationē potissimū spectatur, nō  
 tanta est, quanta L ad A. quandoquidē I, p-  
 pinquius A esse videmus, quā B: ergo etiā  
 L vicinius necessariò est A, quā B. Ex his  
 itaque propositis sequitur, siue ex brachio re-  
 uellere & deriuare simul visum fuerit, siue dū-  
 taxat in imbecillioribus viribus reuellere, &  
 deinde post aliquod tēporis interuallū deriua-  
 re studuerimus, semper diuidendā esse dextrī  
 cubitī axillare. Nisi fortē aliquā triū superiorū  
 costarum sinistri lateris, inflāmatio molesta-  
 uerit. Tunc. n. sinistram axillare vnā tecum  
 aperiendam suadeo, vt ea sectione vicinitas  
 rectitudoq; obseruentur. Porro si prioris se-  
 ctæ aliquis, in homine imbecilliori eodē tēpo-  
 re & reuulsionē & deriuationē celebrare ob-  
 deiectas egri vires recusauerit, ob idq; ad solā  
 reuulsionē, pedis venam secandam arbitre-  
 tur, is semp in dextro poplite externōue mal-  
 leolo venam secabit, nisi aliquam triū supe-



riorum costarum lateris sinistri, phlegmone infestauerit. quod absque longiori demonstratione, te facile ratiocinari non dubito. Nam is medicus huiusmodi sectione distantem procul venam aperiet, & fibrarum rectitudinem consensumque obseruabit. Quamquam tunc parum referre arbitror, siue externi siue interni malleoli venas aperiat, quantumuis fibræ exterioris malleoli cum vena sine pari magis conueniant. Nam quum vtrunque euacuationis per auersionem genus, per communes maioresque venas debere fieri omnibus in confesso sit, poplitis venam longè ad commodam sectionem prætulerim, à qua medicos ob tonsorum imperitiam hodie prorsus manum abstinere videmus. Nos illam sat è non maiori negotio, quàm axillarem, aut humerariam in cubito, iam sæpius aperuimus, & elegans sanguinis fluxus subsecutus est. Nec tecum hic disceptabo, nunc ad solam reuulsionem, ob imbecilliores ægri vires à deriuatione abstinere, coacti, potius dextram axillarem, quàm dextri poplitis venam, secare ex usu sit, quum vtrunque quæstionis membrum optimis argumentis ac rationum adminiculis corroborari queat. Equidem non vereor, diuersis innixus rationibus optimisque demonstrationibus adiutus, modo hanc modo



illam aperire venā. At verò si apud te euice-  
ro, rarissimè sinistri lateris tribus costis supe-  
rioribus, inflammationem in dolore laterali  
subsistere, id quod à me petieras: abūde apud  
te corroboratū arbitror, quod posteaquā  
cum alterius sectæ principibus succinctissi-  
mè egero, obiter subnectā. Vt itaq; eos ocys  
à mea sententia reiiciā, ipsosq; suis principijs  
nequaquā insistere luculenter ostendā, ad ve-  
nas thoracem nutriendes suprā depictas re-  
currendū est, & ipsorum principia tanquam  
vera, disputationis ergò assumenda: quæ fere  
sunt huiusmodi. Humori ad partē aegrā fluē-  
ti, aut fluxuro, debetur reuulsio, quæ secundū  
ipsos est euacuatio ad maximè distantia. Hu-  
mori verò in particula aegra coaceruato inhe-  
rentiq; cōpetit deriuatio, hoc est, humoris ex  
loco affecto per proximum membrū sanum  
auerlio, ob id quæ euacuatio. Deinde subiun-  
gunt: quū hæ euacuationis species in omni-  
bus vitijs ex fluxione abortis conueniunt, ne-  
cessariò quoque eas in inflāmate pleuriti-  
dis, ex vsu censendas esse. Sic tñ, vt ante om-  
nia adhuc sanguini fluenti quidē, atque affe-  
ctū augenti reuulsione, in parte autē laboran-  
te collecto, deriuatiōe, interposito tēporis in-  
terualllo, prospiciatur. Proinde reuulsuri, op-



positā venā impliciti lateris, in cubito secant,  
deinde post tēporis aliquā intercapedinē, eā  
quæ è directo lateris affectū est, parū per Iouē  
eorū quę proposuerunt memores: quū vtri-  
usque pedis venæ, & ambarū manuū hume-  
rariæ remotius, quā axillaris oppositi cubi-  
ti, ab inflātionis loco dissitæ sunt, nec illæ  
tardius ac minus infœliciusq̃, quā hæc è cor-  
pore euacuant. Vt itaque res clarior euadat,  
proponamus adolescentē corpore, sanguine  
turgido, integris viribus, dextrī lateris inflam-  
matione correptū: huic ipsorū aliquis statim  
mittendū sanguinē ex sinistra axillari præscri-  
bet. altera verò die, aut quando fluxū consti-  
tisse arbitrabitur, dextræ manus iecorariā di-  
uidet. Sit itaq̃ inflammatio in aliqua venarū  
F, primum aperient B, vtpote venam magis  
distantē quā A. deinde deriuaturi, & tanquā  
proximiorē venam incisuri diuident A. Sic  
quoq̃ si G. primū A. Quinetiā si aliqua ve-  
narū nouē costarū inferiorū sinistri lateris, in-  
flāmatione occupetur, hoc est L, aperient ilico  
A, deinceps B, suorū principiorū turpiter obli-  
ti: quū inter initia remotior, quæ est B, nō au-  
tē A, quæ propinquior vena est, ex ipsorum  
arbitrio diuidenda erat. Vt interim hic de fi-  
brarū rectitudine nihil addam, p̃sertim apud



eos, quos distantia vicinitasque plus satis coar-  
 guat atque conuincat. Nam I longius distat à  
 B, quàm ab A. sed sanguis ab L, non potest edu-  
 ci aliò nisi per I: ergo necessariò in sanguinis  
 missione, L vicinior est A, quàm B. quod ex  
 præcedenti figura conspiciere quàm facillimum  
 est. proinde ne in illorùm nugis refutandis diu-  
 tius hæreã, ipsis ex falsis suis principijs, huius-  
 cemodi axioma introduco. In quacunque late-  
 ris parte, in thorace, sit inflammatio, exceptis  
 triù superiorùm costarùm sinistri lateris duobus  
 intervallis, diuidendam primùm esse axillarem  
 sinistram, deinde dextrã: quoniã ante omnia  
 remotior, ac deinceps vicinior, ipsis in pleuri-  
 tide secunda putatur. Aut quibus harùm partiũ  
 primoribus, pedis sectio magis quàm contra-  
 riũ lateris inter initia probatur, dicam, perpe-  
 tuò dextri pedis venã primum, deinde dextrã  
 axillare aperiendam: nisi duo dictarum costa-  
 rum intervalla, inflammatione corripiantur.  
 Sed fortè hi obstrepent, quid nos tantillam cu-  
 ramus à te adductam in tanta distantia vici-  
 nitatẽ: vt interim surda aure prætereãt, quod  
 de fibrarùm rectitudine egimus. atque hoc etiã  
 prioris sectæ autores, fibrarum negantes recti-  
 tudinẽ, in medium adducere possent. Cæterũ  
 vtriusque respondebo, mihi maiore cõtra illos  
 vicinitatem



uicininitatem cordi esse, quàm illis minorem ad-  
uersus suos aduersarios, contrarietatem. Dicant  
quæso, an ne pro distantia mediꝝ pollicis, hæc  
nus tam anxie & aniliter digladiatum est, totq;  
inter primos nostrę ætatis viros subortę simu-  
lationes dissidiaq; : me verò præter fibrarum re-  
ctitudinem, maiorem vicininitatem, in medium  
adduxisse? Sed ipsorum vesaniam absq; om-  
ni negotio, dummodo venarum tabulam ad-  
huc semel intueri lubeat, indicaturus sum. Sit  
itaque inflammatio in D, aut in E. aut in F,  
aut in G. aut in K, aut in L: hoc est, in quacunq;  
thoracis parte, in locis tamen è regione sibi cor-  
respondentibus, distantia vnus inflammationis  
ad A, aut ad B alterius vicininitatem latitu-  
dine tantummodo mediꝝ pollicis superabit. Ve-  
rum vt particularius loquar, sit inflammatio in  
F, ipsum A non vicinius est F, quàm venæ B,  
nisi media latitudine venę cauæ. quod liquido  
constat, si animum quis ad venam cauam in iu-  
gulo intenderit. Necesse siquidem est, sangui-  
nem ex F fluere ad C, hoc est iugulum, deinde  
ex C ad A, aut B, prout nimirum hæc aut illa  
vena incidatur. Coëterum id ad deriuationem  
tantum relatũ videretur, in qua partis affectæ  
cũ incisa vena vicininitas potissimum spectatur.  
Age itaque distantiam propter reuulsionẽ cõsi-  
deremus. Si venarum F aliqua inflammatione

D



corripi cœperit, arbitrabuntur se remotius longē venam incisuros, si B aperiant, quā si A: quum tamen à quocunque puncto venarū F, nō remotius distitū sit B, quā A, nisi media latitudine venę cauę, quę in glandio in viro naturalis constitutionis pollicis latitudinē fortasse fortitur. Verum hanc vicinitatem distantiamq; vel mente captus, post exquisitā venarum cognitionē deprehendat. Quamobrem nisi vtriusque hæreseos autores, fibrarum in vtraque auersionis differentia seruandam rectitudinem atque consensum fateantur, ipsos hæcenus de lana caprina asiniq; vmbra rixose disceptasse, quis ignorat: quod tot chartarū & olei dispēdio aduersarios, aut distantia, aut vicinitatē mediꝝ pollicis obseruandā, in sesqui cubiti, aut duorū, nonnunquam & trium cubitorū lōgitudine, docere ad nisi fuerint, quamq; peritus manualis artifex, tantam distantiam aut propinquitatem in venę sectione, etiam si volet triplicem, pensaturus sit. Nihil. n. obstare obseruauī, siue supra cubitum axillarem diuiderem, aut sesquipalma sub cubiti articulo incisionem tentarem, dummodo fluente sanguine, alteram mediarum digito comprimerem, ne ex humeraria quoque sanguis efflueret. Imò cum meis commilitonibus in præceptorum nostrorum ægris, vsus experientiæq;



gratia, duas sectiones in ramis axillaris venæ sub cubiti media regione aperuimus, quum remotiori in cubito vena secta, foeliciter et copiose sanguinē vacuare studeremus. Hinc profecto, si sola distantia, aut vicinitas propositę disputationis de secāda vena cubiti in dolore laterali scopus esset, quācuncq; etiā thoracis partē inflammatio inualisset, huius ne an illius cubiti venā inciderē, ne pilo quidem redimerē. An ne itaque nobile illud Hippocratis de fibrarū rectitudine ac consensu dogma respuētes, pulchrē inter se conuiciari & canū more oblatrare, tibi videntur? adeo sane, vt publico edicto in Hispania metentibus, venæ sectione ē directo affecti lateris interdictū fuerit. Post longas enim Salmanticæ habitas hac de re disputationes, qui succubuerunt apud illustrissimū Hispaniæ senatum (vt scribis) cōquesti sunt, non minorē humanis corporibus venæ sectionem quę ē directo fit perniciem adferre, quā mortalium animis Lutheranorum schismata. Cuius equidē rei euentum quā auidissime expecto, quæq; sit futura hac in lite sententia: num Cæsarea Maiestas id ratum habere confirmariq; volet. Vobis siquidem in Liguria pacem tractantibus, suo illi præiudicio tantis, vt aiebant, malis obuiam processerunt, donec vos Hispaniæ ἀρχιεργοι hac de re ex vestro arbitra-

D ii



tu statuissetis. Certiorē interea pater meus me reddidit, quosdā apud inuictissimā Cæsaris clemētiam supplicibus libellis id strenuē egisse, ut sublimi autoritatis suæ p̄rogatiua ipsorum decreta atque sententias velut vallo tutissimōque p̄sidio aduersus antagonistarum impressiones munirent. quibus vel ob hoc minime indulgebāt, neque de suo concedet iure, quòd tristem sanē Principis Pedimontani obitum alta mente repositum etiam nunc conseruet: quem medicos venam in cubito oppositi lateris secantes interemisse, aulici clanculum obmurmurant. hos enim reuellere studentes, & modicum (ut deruationi sanguis reseruaretur) euacuantes, ex simplici ut vocant pleuritide, duplicem induxisse ferunt: haud perpendentes, viro Principi longiori vita digno, plus noxæ huiusmodi sectione inductum fuisse, quā si ipsis vocatam heresim illi inspirassent: quum huic forte sua suadela sacerdos aut monachus quispiam, illi ne totus quidem diuinus Asclepiadum chorus mederi potuisset. Da operam interim oro, ne tuorum collegarum sententię cedas: quin potius tot Italię, Germanię & Galliæ eximie eruditionis viros, Cæs. Maiestati propone, qui discussis veteris inscitie tenebris, è directo affecti lateris secandam venā arbitrantur. Quod te conaturum haudquaquam diffido, qui vnus

NICOL.

regni Hispani  
Hispanorum  
fortasse, ut re  
quispiam ho  
res morali  
pionibus  
nabilis. C  
rum profes  
dicorum c  
Erat Helu  
Patau an  
nis imperi  
medicina  
uissimis  
aiebat ill  
rum gen  
scant, qu  
niciolus  
pune ipse  
splendidi  
re stude  
ni ad hoc  
superio  
rarissim  
dicti ad  
muner  
maior  
nas, qu



regni Hispaniæ primariorum sis medicus, & Hispanorum illustrium amantissimus. Aliter fortasse, vt rem sedulo promoueres, refractarius quispiam horreretur: arbitratus, nihil esse inter res mortalium peruersis medicorum præceptionibus, humano generi exitialis, aut damabilius. Quod festiuiter admodum, nostrorum professorum facetissimus quidam in medicorum comitijs non ita pridem proposuit. Erat Heluetius sacrificus, medicinæ insignia Patauij ambiens: verum quum ea ob hominis imperitiam (nunquam enim vel à limine medicinam salutarat) ab alijs professoribus, grauiissimis in eo negocio censoribus recusarentur, aiebat ille pro sacrificio certans: cum Heluetiorum gentem nobis infestam esse omnes cognoscant, quid quæso illis tum capitalius, tum perniciosius à nobis proficisci posset, quàm si impune ipsos interficientem apostatam aliquem splendido insignitum titulo, ipsis condonare studeamus? Sed vt colophonem disputationi adiñciam, superest ut demonstrem, duo trium superiorum sinistri lateris costarum interualla, rarissimè phlegmone infestari. Afferunt medici ad vnum omnes, inflammatione potissimum eam partem corripì, quæ rarior, laxior & maior est, quæ plures grandioresq; fortitur venas, quæ ceteris imbecillior, atque multo magis

D iii



si nobilioribus partibus vicinior fuerit. Omnia verò hæc mediarum costarum interuallis, id est quintæ, sextæ, septimæ & octauæ inesse, quis inficiabitur? In his enim costis, membranam ipsas succingentem, non adeò vt in inferioribus superioribusque costis annexam, ideòque facilius abscedere, ex Anatome liquidò constat: quare ea pars rarior & laxior necessariò censenda est. De magnitudine nihil attinet dicere, quum vna quæ ordine sexta est, ferè duabus superioribus maior & longior existat. Quòd quidem pluribus, ijsque maioribus abundant venis, præter sectionem ratio quoque suggerit. Magnis enim corporibus, magna quæ alimentum subministrent, debentur instrumenta. Deinde ceteris costis has imbecilliores esse, hinc conficitur, quod in eodem genere partium illæ robustissimæ censentur, quibus maior vsus actio conceditur: quæ magis superioribus inferioribusque quàm medijs costis obtigisse, nemo negauerit, qui inferioribus quidem septum transversum, totius corporis nobilissimum musculus, viderit annexum: superioribus vero multos insignes musculos, qui cum medijs costis nequaquam communes sunt. Quum vero imbecilliores cordi pulmonibusque viciniore existunt, non mirum est, ipsas citius cæteris fluxionem suscipere,



atque adeò phlegmone tentari. Adde in pleu-  
ritide, dum sacculos & emplastra affecti loci  
cognoscendi gratia medici quidam accommo-  
dant, circa mediam thoracis sedem potissimum  
exiccati, atque egros in laterali morbo pun-  
ctilem dolorem circa lateris medium sentire,  
qui phlegmones regionis certissimus est index.  
Tensionem namque quæ in iugulo percipitur,  
non moror, quum illam quavis etiam mem-  
branæ costas succingentis parte tensa, in iugu-  
lo sentiri, antea demonstrauimus. Experien-  
tiam, ut ipse nosti, ad præsentis negotij corro-  
borationem, nullam adferre debeo: quum hac  
mea ætate paucos hætenus eo morbo impli-  
citos, nisi cum præceptoribus inuiserim. om-  
nes tamen quos verè eo morbo vexari conie-  
ci, circa medium potissimum lateris affici ob-  
seruavi, & nunquam circa iugulum puncti-  
lem dolorem ægros percepisse animaduerti.  
Nec arbitror inflammationis corpus latius ex-  
tendi, quàm ad duo intercostalium partium  
interualla. & si fortè plura interualla affici si-  
mul quis dixerit, subiungam, in tribus superio-  
ribus costis sinistris solam inflammationem  
nequaquam subsistere, sed vnà & inferiores  
partes ab ipsa infestari. Quare & tunc non mi-  
nus verum erit, inflammationē in venis G, &  
aliquibus L existere: atque idcirco ambiguam  
D iiii



uæne sectionem medico in superiorum illarum  
 costarum inflammationibus occurrere, necessa-  
 riū est. Proinde prioris sectę principijs, apud te  
 minimè probandis innixus, subnectam. IN  
 OMNIBVS LATERVM THORA-  
 CIS, AVT VERTEBRARVM ME-  
 TAPHRENI INFLAMMATIONI-  
 BVS SI SANGVINIS MISSIONEM  
 AFFECTVS PRAESCRIBAT, SE-  
 CANDAM ESSE AXILLAREM  
 DEXTRAM: id quod probandum mihi  
 assumpseram. Ad hanc meam à nemine prius  
 excogitatam de vena in pleuritide secanda sen-  
 tentiam, adniterer Hippocratis oraculum in se-  
 cundo de Victus ratione morborum acutorū  
 pertrahere, nisi manifestissima Galeni autoritas  
 reclamaret, de qua nō minus ferè ambigere ve-  
 reor, ac si in nostra sanctissima religiōe, animarū  
 immortalitatem tacitus in dubium vocarem.

„ Scripsit quidem in eo lib. Hippocrates. Quum  
 „ ergo ad iugulum dolor extēditur, aut grauitas  
 „ vel brachium, vel mammillam, aut partes quæ  
 „ supra transversum septum sunt infestat, interna  
 „ cubiti vena secanda est. Hunc Aphorismū ge-  
 „ nuinum esse Hippocratis, cum Galeno affirma-  
 „ rem. at eum qui in iij. lib. de Ratione victus in  
 „ morbis acutis legīt, vbi ē directo lateris affecti  
 „ venam secandam autor eius libri pponit, Hip-



pocratis non esse, quēadmodum nec totum eū  
 librum assererem: deinde eam sententiam (vt  
 plurimas eius libri alias) Hippocrate indignā  
 censendam ducerem: quod Hippocrates dextrā  
 axillarem secandam in secundo libro precepe-  
 rit. Quid obstiterit obsecro, quo minus fide te-  
 nendum sit, Hippocratem breuitatis studiosis-  
 simum ita locutum, vti & apud Græcorum &  
 Arabum plerosque, & in omnibus nobis ho-  
 die receptissimum est: Nam Galenus alioquin  
 perpetuò se ipsum explicans, Paulus, Aetius,  
 Alexander, Oribasius, Rhazes, Auicenna,  
 & cætera Arabum cohors venam axillarem,  
 communem, humerariam secandam subinde  
 hortantur, non adiicientes dextram, quum  
 eam tamen aperiri certissimò velint. At quum  
 ex sinistra aliquam secandam præscribunt,  
 nunquam non sinistri cubiti, aut pedis sinistri  
 adiiciunt. Præterea in legitimis Hippocratis  
 libris nunquam dextram additam inuenimus,  
 nisi ad certissimam sinistrae distinctionem,  
 quum tamen ipsum dextram indicasse in com-  
 perto habeamus. Adde & nostros hodie me-  
 dicos, aduenarum incisores imperitissimos af-  
 fectuum ac morborum homines scribere, Ape-  
 riatur basilica, mediana vel cephalica, ad qua-  
 tuor aut quinque vascula: vel (vt alij) ad nouem  
 aut decē vncias, quum tamen dextram, nō qui-



dem sinistram, diuidere in animo conceperint: Adijcerem sanè plura, quæ hanc meam sententiam stabilirent: similiter & locum libri de Morbis, vbi autor de pulmonum inflammatione & laterali dolore absque sputo pertractans iubet, secandam esse venam in manu iecorariam, vel lienicam in ea parte quæcunque ea sit καὶ ὁποῦτις ἔν ἐστι τὸ νόσημα, id est, in qua morbus fiat, explicatius euoluerem, nisi apud te Galeni studiosissimum temeritatis atque adèò impietatis arguerer. idque tum imprimis, quando denuo de hæmorrhoidum venarum ortu, ab ipso propemodum dissentendum mihi esset. Ad finem primæ tabulæ de venis, dum venæ portæ ramos recensuissem, obiter ascripti. Hec numerose (de maiori portæ propagine loquens) inter mesarei membranas distributa, ad intestina excurrit, à qua etiam non minima pars ad rectum intestinum pertinet: Verum ab hac ne, an à caua, venæ quas hæmorrhoides appellamus diffundantur, non auisim certo affirmare. Nam per portæ ramos ad sedem pertinentes, melancholicum succum expurgari, non absurdum forte animaduertenti apparebit. Anno enim superiori diligentius hæmorrhoides venas inquirens, vt amico astanti, eoque morbo molestè aliquando vexato, morem gererem, primum in tres in-



cidi arterias, quas à magna arteria, qua ossi sa-  
 cro incumbit ortas, manifestò reperimus. Has  
 pro hemorrhoidibus aliàs ostensas, studiosi a-  
 stantes affirmarunt. Videbantur enim venæ,  
 quod magna sanguinis spirituosæ copia in eis  
 confluxisset. Nosti namque, ex arteriæ magnæ  
 super os sacrum seu latum innixu, & frequen-  
 tiori inter secandum ipsius compressione, vici-  
 niores ramos tanquam venas distendi, illisque  
 concolores reddi. Verum eum qui antea illas  
 hemorrhoidum loco commonstrare sæpius cō-  
 suevit, facile hallucinari ostendimus. Nam præ-  
 terquam quòd essent arteriæ, in ossis sacri fo-  
 ramina, non autem in recti intestini finem, ter-  
 minabantur. Quamobrem ad venæ caue ramos  
 accedens, eas diligenter inuestigavi, quos  
 Parisiis ac Louanij adhuc in administratione  
 rudior, hæmorrhoides producere, seu deriuare,  
 credideram. At vero posteaquam rem ex-  
 actius aggressus sum, eos ramos in minores ac  
 in capillares venas distrubutos reperi, quæ in  
 sedis cutem & musculum *αφ' οὐκτις* vocatum, tã-  
 dem inferebantur. Proinde quum eos ramos  
 venas hæmorrhoidas esse diffiderem, quod-  
 que in hirundinibus applicandis in homine  
 nequaquam melancholico grandiores venas  
 aliquândo conspexissem, cœpi mecum cogitare,  
 num à portæ ramis venæ hæmorrhoides ppa-



garentur: atque mox portę ramū qui cum recto intestino adhuc in corpore relictus erat, aggressus sum, atque dilucidē ad extremū vsque sedis eum pertinere animaduerti, non recta linea quidem, vt in reliquis intestinorum anfractibus, sed ad anū intestini recti finem amplexantem. Quare ea Anatome à portę ramis hemorrhoides venas esse, mihi facile persuasit, donec per occasionem in corpus incidissem, quod hæmorrhoidum vitio ante mortem laborasse conijcerem. Nostrum enim quod tum premanibus habebam, nondū annum vnde- uigesimum attigerat, & optimi habitus, partibusq; integerrimis esse videbatur. Deinde me cū perpendens, num ratio Anatomę speculationē corroborare posset, ratiocinabar, vtrum ne melancholicus succus facilius & breuiori cōpendio per portam, an per cauam, expurgaretur. Nam si per cauam vacuaretur, per portam in iecoris sinum regurgitare ipsum necesse esset, dein per angustissima orificia venę portę in minimos cauę ramulos (dummodo ad iecoris gibbum repere posset) ascendere. Insuper ex cauę principio iecorisq; gibbo, longo tramite ad os sacrum cōfluere deberet, hinc in alias venulas paulo minores et minores, donec per sedē excerneretur. præterea hemorrhoidibus affectos, semper ferē nigro arquato ve-



xari, rationi consonū esset. Porro si à portē ramis deferri ipsum crediderimus, facillima atque cōpendiosa admodū erit via. Nam quem admodum in ventriculī fundum potius meat sentētia, quā ad ipsius os superius, succus melancholicus à liene mittitur, ita quoque in portē ramū ad intestina pertinentē, lien ipsum expurgaret, ex quo rectissimē ad sedē deorsum is succus pflueret. Aut si lien imbecillior ipsum attrahere nequiret, tunc sua naturali gravitate melancholicū succū ad sedē posse rectā promanare certissimō cōstabit, in sectionibus corporum diligenter versato. Adde hos quibus eiusmodi venarū fluxus nō oppotunē supprimitur, in aquā subtercutē, ascitem scilicet, aut tympanitē sæpissime decidere: non alia fortassis ratione, quā quod succus ille frigidus, à liene non attractus, & sua multitudine portā replens, iecur refrigerat,, atque ipse humor in aquā aut flatus dissolvitur, vnde aquā subtercutem induci cōstat. Præterea si in hominibus succulentis, nec hæmorrhoidum vitio obnoxiijs, aliquando aut ob sanguinis sputum, aut aliam sanguinis ex superioribus eruptionem hīruidines sedi, sanguinis reuellendī gratia, applicamus, sanguinem tenuem aqueum, qualis in porta inueniri consuevit, excerni obseruauimus. Sed hæmorrhoidum vitio affectis,



crassus, niger, & omninò melancholicus proma-  
 nat. Et licet hæc præter alia satis efficacia mihi vi-  
 debant, tamen & in tabulis, & in quatuor libris  
 institutionum Anatomicarum Ioannis Guinterij,  
 quos multis locis correctiores reddidimus, quàm  
 potui timidissimè ea adnotavi: siquidem rem ta-  
 citè à me indicatam potius malui, quàm ita esse scioli  
 cuiusdam instar decantatam. id imprimis stu-  
 dens, ut in posterum, num res ita se habeat, ani-  
 madvertere studiosi valeant. Pari ratione quo-  
 que omnibus medicis verissimum theorema,  
 num arteriæ & cor eodem pulsus modo pul-  
 sant, in dubium tacitè inibi vocavi. nam mihi  
 nonnullis argumentis cordis motus ac arteria-  
 rum, planè pugnans contrariusque apparebat.  
 Quum cor enim contrahitur, spiritum in arte-  
 riam magnam, & sanguinem in venam arterio-  
 sam diffundit, estque is motus cordis *συστολή*. Quò  
 verò cordis sinus dilatantur, aerem ex arteria ve-  
 nali, & sanguinem ex caua cor assumit, qui mo-  
 tus propriè est cordis *διαστολή*. Arterijs autem dila-  
 tatis, vitalem spiritum corpori illas communica-  
 re credimus, ipsasque eo spiritu à corde repleri.  
 quum verò arctantur, fuliginosa excrementa ex-  
 pelli in confesso habemus. Quare contrarios &  
 pugnantes motus cordis arteriarumque esse, relin-  
 quitur. In vivis autem dissectis animantibus, ali-  
 quo pacto id experiri licebit, si arteriæ ossi sacro



incumbenti manus vnà adhibeatur, & vniuersum cor illæsum altera manu comprehendatur. Vt interim præteream capitis motū, varios musculos & nervos etiam, quos modesta mea admonitione studiosi assequi valebunt. Verum hac de re aliās prolīxius, superis fauentibus, coram confabulabimur. Interim tuarum erit partitū, vir literatissime, hæc æqui boniq; consulere, eademq; hilaritate ac animi prōptitudine, qua alia tui Vvesaliū aliquando accepisti, suscipere, qualiterq; accurato tuo iudicio probantur, pxi-me ad me transcribere. Ea tamen legas velim, vt tumultuaria ac confusanea verius quàm accurata cura conscripta: tibiq; non omnibus autē, communicata esse arbitreris. Proinde sicubi oratio inequaliter fluat, suisq; numeris parum constare videat, pro singulari humanitate tua ignores. Quod de reliqua studiorum meorum ratione transcribam, nihil propemodum in præsentiarum superest. Duas nervorum tabulas iā quoq; absoluimus, priori cerebri septem paria delineata sunt, in altera vniuersæ dorsalis medullæ ramuli exprimunt. Adhuc eas seruandas duxi, donec musculorū tabulas & interiorū partitū omniū aggrediamur. nos p̄sentis anni cōsecutionibus rationē q̄ id cōmodissimè fieri posset, cētauimus: sed in tāta spectatoꝝ turba, eā rē absoluerē, fuit omnino impossibile. Si hic ea foret



corporum opportunitas, quę alibi aliquando obtingere potuisset, non diu tā vtili labore studiosi carerent: quum ad eam prouinciā subeūdā tot celebres viri in dies me exhortentur atq; inuitent. Non facile tibi persuaseris, q̄ prāter ceteros, mea causa, Marcus Antonius Genua, philosophiā primarius professor, atq; nostrā Academicę vniuersęq; Italię ob absolutissimam illā philosophię, medicinę & literarum cognitionē pręcipuum decus ac ornamentum, me ad hanc prouinciā subeundam incitet, & inflammatū reddat. Cui sanē nisi morem gessero, ab impietatis nota atq; crimine vix me vindicare queam: quod is singulari quodam animi cādore, vt est vir humanissimus, exterorumq; amantissimus, me amplectitur, atq; alterum veluti mihi parentem se cxihet. Quamobrem si corporum dabitur opportunitas, & suam operam Ioannes Stephanus insignis nostrę ætatis pictor non denegauerit, nequaquam ego eum laborem subterfugero. Interim vale & me vt facis maximē ama. Patauī, ex edibus filiorū illustrissimi Comit̃s Gabrielis ab Ortemberg. Calend. Ianuarij. Anno salutis. M. D. XXXIX.

Tuę pręstantiæ deditissimus

Andreas Vvesalius:

FINIS.



D

quando  
ore stu  
subeu  
ur atq  
ram ce  
nua phi  
re Aca  
am illa  
utione  
hanc  
matu  
pieta  
ream  
ut est  
mus,  
aren  
dabi  
Se  
re  
er  
me  
To  
a

s:



